Axel Wehrend

Leitsymptome Gynäkologie und Geburtshilfe beim Hund

Diagnostischer Leitfaden und Therapie

176 Abbildungen

13 Tabellen

Enke Verlag · Stuttgart

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Anschrift des Autors

Prof. Dr. med. vet. Axel Wehrend

Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie
der Groß- und Kleintiere mit Tierärztlicher Ambulanz
Frankfurter Straße 106
35392 Gießen

Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist die Veterinärmedizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere Kenntnisse, insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangen. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem **Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht**.

Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. **Jeder Benutzer ist angehalten**, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der verwendeten Präparate – gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten – festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in diesem Buch abweicht. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden sind. Vor der Anwendung bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen, ist auf die in den einzelnen deutschsprachigen Ländern unterschiedlichen Zulassungen und Anwendungsbeschränkungen zu achten. **Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.** Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen.

© 2010 Enke Verlag in
MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH & Co. KG
Oswald-Hesse-Str. 50, 70469 Stuttgart

Unsere Homepage: www.enke.de

Printed in Germany

Eine Veröffentlichung der Redaktion der Zeitschrift
kleintier konkret
Enke Verlag in MVS Medizinverlage Stuttgart
GmbH & Co. KG

Umschlaggestaltung: Thieme Verlagsgruppe
verwendete Fotos von: Photodisc Inc.
Zeichnungen: Angelika Brauner, Hohenpeißenberg
Satz: medionet Publishing Services Ltd., Berlin
gesetzt in: Adobe InDesign CS3
Druck: Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG, Calbe

Geschützte Warennamen (Warenzeichen ®) werden **nicht immer** besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen oder die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Vorwort

Wer etwas niederschreibt, muss Kürzen und Vereinfachen. Das tut weh. Spezifitäten und Ausnahmen gehen verloren, *dafür wird die Linie sichtbar und kann weitergegeben werden*. Dies soll der Sinn des vorliegenden Buches sein – einen diagnostischen Leitfaden für die Kolleginnen und Kollegen, welche sich mit der Reproduktionsmedizin bei der Hündin beschäftigen, zu bieten. Es ist kein alles umfassendes Nachschlagewerk, sondern hat sich an den häufigen Problemen, die bei der Betreuung der Hündin auftreten, orientiert.

Danken möchte ich Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. H. Bostedt, der mir 1998 den Auftrag gab, mich mit der Fortpflanzungsmedizin beim Kleintier zu beschäftigen, und den Mitarbeitern und

den Patientenbesitzern, die mich jeden Tag mit ihren Fragen dazu zwingen, Antworten zu finden. Weiterhin gebührt Dank der Deutschen Bahn. Die zahlreichen Verspätungen und damit verbundenen Zwangsaufenthalte auf Bahnsteigen und in Wartehallen haben Zeit geschaffen, an diesem Buch zu schreiben.

Vielen Dank auch an Frau Dr. Ulrike Arnold für die letzten Jahre der fruchtbaren und freundschaftlichen Zusammenarbeit. Du wirst mir in der veterinärmedizinischen Community fehlen.

Gießen, August 2009

Axel Wehrend

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V	4.1	Zeitlicher Ablauf der Geschlechtsentwicklung	21
Teil I		4.2	Störungen der Geschlechtsentwicklung	22
Basiswissen und Untersuchungsgang	1	4.2.1	Zwitter und Missbildungen	22
1 Praktische Aspekte der Anatomie und Physiologie der Geschlechtsorgane	2	4.2.2	Virilisierung der weiblichen Geschlechtsorgane	22
1.1 Äußere Geschlechtsorgane	2	5 Pubertät, Geschlechtsreife, Zuchtreife		24
1.1.1 Rima vulvae	2	5.1 Pubertät		24
1.1.2 Klitoris	3	5.2 Geschlechtsreife		24
1.1.3 Gesäuge	3	5.2.1 Klinische Bedeutung der Pubertät und Geschlechtsreife		24
1.2 Innere Geschlechtsorgane	4	5.3 Zuchtreife		25
1.2.1 Vestibulum und Vagina	4	5.4 Zyklusanomalien der jungen Hündin		25
1.2.2 Zervix	6	5.4.1 Stille Läufigkeit		25
1.2.3 Uterus	6	5.4.2 Split-Östrus		25
1.2.4 Eileiter	6	5.4.3 Nichtdulden des Rüden		25
1.2.5 Ovarien	6	5.5 Zyklusanomalien der älteren Hündin		26
2 Hormonelle Regulation der Sexualfunktionen	8	6 Gravidität		27
2.1 Bildungsorte	8	6.1 Chronologischer Ablauf der Gravidität		27
2.1.1 Hypothalamus	8	6.2 Endokrine Veränderungen während der Gravidität		27
2.1.2 Hypophyse	8	6.3 Graviditätsdauer		28
2.1.3 Ovarien	9	7 Geburt		29
2.1.4 Weitere Hormonquellen	9	7.1 Geburtsstadien		29
2.2 Sexualhormone	9	7.1.1 Öffnungsphase		29
2.2.1 Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH)	9	7.1.2 Austreibungsphase		29
2.2.2 Follikelstimulierendes Hormon (FSH) und Luteinisierungshormon (LH)	9	7.1.3 Nachgeburtssphase		30
2.2.3 Prolaktin	9	8 Wurfgröße		31
2.2.4 Oxytozin	10	9 Der gynäkologische Untersuchungsgang		32
2.2.5 Östrogene	10	9.1 Anamnese		32
2.2.6 Progesteron	10	9.2 Klinische Untersuchung		35
2.2.7 Relaxin	12	9.2.1 Allgemeinuntersuchung		35
3 Sexualzyklus	13	9.2.2 Spezielle gynäkologische Untersuchung		35
3.1 Proöstrus	15	9.3 Weiterführende Untersuchungen		48
3.2 Östrus	16	9.3.1 Bildgebende Verfahren		48
3.3 Metöstrus	18	9.3.2 Labordiagnostik		52
3.4 Anöstrus	19	10 Trächtigkeitsuntersuchung		59
3.5 Präproöstrus	20	10.1 Indikation		59
4 Geschlechtsentwicklung und deren Störungen	21	10.2 Häufige Fehler		59
		10.3 Zeitpunkt der Untersuchung		59

10.4 Methoden zur Trächtigkeitsuntersuchung	60	13.3.10 Stille Läufigkeit	84
10.4.1 Hormonkonzentrationsbestimmung	60	13.3.11 Physiologischer Anöstrus	84
10.4.2 Palpation	60	14 Hündin lässt sich nicht decken	85
10.4.3 Sonografie	60	14.1 Allgemeine Anmerkungen	85
10.4.4 Röntgen	61	14.2 Besondere Aspekte des diagnostischen Vorgehens	85
10.4.5 Verhalten und körperliche Veränderungen	61	14.2.1 Häufige Fehler	85
11 Der geburtshilfliche Untersuchungs-gang	62	Diagnostischer Leitfaden	86
11.1 Anamnese	62	14.2.2 Besonderes Augenmerk bei der Anamnese	88
11.2 Klinische Untersuchung	63	14.2.3 Allgemeinuntersuchung	88
11.2.1 Allgemeinuntersuchung	63	14.2.4 Gynäkologische Untersuchung	88
11.2.2 Spezielle geburtshilfliche Untersuchung	64	14.3 Ursachen und Erkrankungen	88
11.3 Weiterführende Untersuchungen	67	14.3.1 Falscher Bedeckungszeitpunkt	88
11.3.1 Bildgebende Verfahren	67	14.3.2 Fehlerhaftes Deckmanagement	88
11.3.2 Labordiagnostik	71	14.3.3 Angeborene Veränderungen im Bereich Vulva, Vestibulum und Vagina	89
12 Dokumentation und Besitzer-aufklärung	72	14.3.4 Erworbene Veränderungen im Bereich Vulva, Vestibulum und Vagina	90
12.1 Dokumentation	72	14.3.5 Schmerzhaft Zustände im Bereich von Rute, Becken, Hintergliedmaßen	91
12.2 Aufklärung	72	14.3.6 Störungen des Paarungsverhaltens	91
Teil II		15 Hündin ist leer geblieben	92
Leitsymptome, Diagnostik und Therapie	75	15.1 Allgemeine Anmerkungen	92
13 Hündin wird nicht läufig	77	15.2 Besondere Aspekte des diagnostischen Vorgehens	92
13.1 Allgemeine Anmerkungen	77	15.2.1 Häufige Fehler	92
13.2 Besondere Aspekte des diagnostischen Vorgehens	77	15.2.2 Besonderes Augenmerk bei der Anamnese	92
13.2.1 Häufige Fehler	77	15.2.3 Gynäkologische Untersuchung/ weitergehende Untersuchung	94
Diagnostischer Leitfaden	78	Diagnostischer Leitfaden	94
13.2.2 Besonderes Augenmerk bei der Anamnese	80	15.3 Ursachen und Erkrankungen	96
13.2.3 Allgemeinuntersuchung	80	15.3.1 Falscher Zeitpunkt der Bedeckung	96
13.2.4 Gynäkologische Untersuchung	80	15.3.2 Art der Bedeckung	96
13.3 Ursachen und Erkrankungen	81	15.3.3 Qualität des Spermias	97
13.3.1 Störungen in der sexuellen Differenzierung	81	15.3.4 Hypoluteoidismus	97
13.3.2 Durch Medikamente induzierter Anöstrus	81	15.3.5 Hypothyreose	97
13.3.3 Durch Rudelmitglieder unterdrückte Läufigkeit	81	15.3.6 Zu kurzes Zwischenläufigkeitsintervall	98
13.3.4 Lutealzysten/persistierende Gelbkörper	82	15.3.7 Follikelatresie/anovulatorischer Zyklus	98
13.3.5 Hypothyreose	82	15.3.8 Infektionen	98
13.3.6 Hyperadrenokortizismus	82	15.3.9 Störungen in der Entwicklung der Geschlechtsorgane	99
13.3.7 Idiopathische Azyklie	83	16 Ausfluss aus der Rima vulvae	100
13.3.8 Kastration	83	16.1 Allgemeine Anmerkungen	100
13.3.9 Zu geringes Lebensalter	83	16.2 Besondere Aspekte des diagnostischen Vorgehens	100
		16.2.1 Häufige Fehler	100

16.2.2	Besonderes Augenmerk bei der Anamnese	100	18.2.3	Allgemeinuntersuchung	122
16.2.3	Allgemeinuntersuchung	100	18.2.4	Gynäkologische Untersuchung/ weitergehende Untersuchung	123
16.2.4	Gynäkologische Untersuchung/ weitergehende Untersuchung	100		Leitfaden Untersuchung und Maßnahmen bei Abort	124
	Diagnostischer Leitfaden	102	18.3	Abortursachen	126
16.3	Ursachen und Erkrankungen	104	18.4	Diagnostik	128
16.3.1	Offene Pyometra	104	18.5	Therapie	128
16.3.2	Offene Mukometra/Hydrometra	106	18.6	Prävention	130
16.3.3	Offene Hämometra	107	19	Umfangsvermehrung im Gesäuge	131
16.3.4	Vestibulovaginitis	107	19.1	Allgemeine Anmerkungen	131
16.3.5	Juvenile Vaginitis	107	19.2	Besondere Aspekte des diagnostischen Vorgehens	131
16.3.6	Tumoren	108	19.2.1	Häufige Fehler	131
16.3.7	Fruchtverluste/Abort	108	19.2.2	Besonderes Augenmerk bei der Anamnese	131
16.3.8	Puerperalstörungen	109	19.2.3	Allgemeinuntersuchung	131
16.3.9	Verletzungen	110	19.2.4	Gynäkologische Untersuchung/ weitergehende Untersuchung	131
16.3.10	Läufigkeit	111	19.2.5	Entnahme einer Milchprobe	132
16.3.11	Geburt	111	19.2.6	Bildgebende Verfahren	132
16.3.12	Lochialfluss	111	19.2.7	Lymphknotenbiopsie	132
17	Hündin in der Geburt	112	19.2.8	Labordiagnostik	132
17.1	Allgemeine Anmerkungen	112		Diagnostischer Leitfaden	134
17.1.1	Ist die Hündin in der Geburt?	112	19.3	Ursachen und Erkrankungen	136
17.1.2	Liegt eine Eutokie oder Dystokie vor?	112	19.3.1	Mammatumor	136
17.1.3	Besteht Lebensgefahr für die Hündin und die Feten?	113	19.3.2	Mastitis	136
17.2	Besondere Aspekte des diagnostischen Vorgehens	113	19.3.3	Milchstau	137
17.2.1	Häufige Fehler	113	19.3.4	Lactatio sine graviditate (Schein- gravidität)	138
17.2.2	Besonderes Augenmerk bei der Anamnese	113	20	Vorfall von Gewebe aus der Vulva	139
17.2.3	Allgemeinuntersuchung	113	20.1	Allgemeine Anmerkungen	139
17.2.4	Geburtshilfliche Untersuchung/ weitergehende Untersuchung	113	20.2	Besondere Aspekte des diagnostischen Vorgehens	139
	Leitfaden Untersuchung und Maß- nahmen bei der Geburt	114	20.2.1	Häufige Fehler	139
17.3	Konservative Geburtshilfe	116	20.2.2	Besonderes Augenmerk bei der Anamnese	139
17.3.1	Häufige Fehler	116	20.2.3	Allgemeinuntersuchung	139
17.3.2	Durchführung	116	20.2.4	Gynäkologische Untersuchung/ weitergehende Untersuchung	139
17.4	Sectio caesarea	118		Diagnostischer Leitfaden	140
17.4.1	Häufige Fehler	118	20.3	Ursachen und Erkrankungen	142
17.4.2	Anästhesie	118	20.3.1	Vaginalprolaps/Läufigkeitsprolaps	142
17.4.3	Operationsdurchführung	119	20.3.2	Vaginaltumoren	142
18	Abort	122	20.3.3	Transmissibler venerischer Tumor (Sticker-Tumor)	144
18.1	Allgemeine Anmerkungen	122	20.3.4	Geburt/Abort	144
18.2	Besondere Aspekte des diagnostischen Vorgehens	122	20.3.5	Uterusprolaps post partum	144
18.2.1	Häufige Fehler	122			
18.2.2	Besonderes Augenmerk bei der Anamnese	122			

21	Die verlängerte Läufigkeit	145
21.1	Allgemeine Anmerkungen	145
21.2	Besondere Aspekte des diagnostischen Vorgehens	145
21.2.1	Häufige Fehler	145
	Diagnostischer Leitfaden	146
21.2.2	Besonderes Augenmerk bei der Anamnese	148
21.2.3	Allgemeinuntersuchung	148
21.2.4	Gynäkologische Untersuchung/ weitergehende Untersuchung	148
21.3	Ursachen und Erkrankungen	148
21.3.1	Ovarialzysten	148
21.3.2	Ovarialtumoren	150
21.3.3	Aufnahme von exogenen Östrogenen	151
21.3.4	Split-Östrus	152
21.3.5	Vaginitis/Zystitis	152

Teil III

	Häufige Probleme und Fragestellungen	153
22	Deckzeitpunktbestimmung	154
22.1	Biologischer Hintergrund	154
22.2	Häufige Fehler	154
22.3	Durchführung der Deckzeitpunktbestimmung	155
23	Kastration	157
23.1	Definition	157
23.2	Rechtliche Grundlagen	157
23.3	Ziele der Kastration	158
23.4	Häufige Fehler	159
23.5	Unerwünschte Nebenwirkungen der Kastration	159
23.6	Durchführung der Kastration	161
23.6.1	Technik	161
23.6.2	Zeitpunkt	161
23.6.3	Alternativen zur Kastration	162
23.6.4	Besitzerberatung/Aufklärungspflicht	162
24	Unvollständige Kastration	163
24.1	Definition	163
24.2	Rechtliche Bewertung	163
24.3	Symptomatik	163
24.4	Diagnose	163
24.5	Therapie	164
24.6	Prävention	164
25	Trächtigkeitsabbruch	165
25.1	Indikationen	165

25.2	Häufige Fehler	165
25.3	Methoden	165

Teil IV

	Wichtige Gynäkologika	167
26	Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH)	168
26.1	Biologische Grundlagen	168
26.2	Veterinärmedizinischer Einsatz	168
26.3	Nebenwirkungen	169
27	Gonadotropine	170
27.1	Biologische Grundlagen	170
27.2	Veterinärmedizinischer Einsatz	170
27.3	Nebenwirkungen	170
28	Gestagene	171
28.1	Biologische Grundlagen	171
28.2	Veterinärmedizinischer Einsatz	171
28.3	Nebenwirkungen	171
29	Antigestagene	173
29.1	Biologische Grundlagen	173
29.2	Veterinärmedizinischer Einsatz	173
29.3	Nebenwirkungen	173
30	Östrogene	174
30.1	Biologische Grundlagen	174
30.2	Veterinärmedizinischer Einsatz	174
30.3	Nebenwirkungen	174
31	Antiprolaktine	175
31.1	Biologische Grundlagen	175
31.2	Veterinärmedizinischer Einsatz	175
31.3	Nebenwirkungen	176
32	Prostaglandine	177
32.1	Biologische Grundlagen	177
32.2	Veterinärmedizinischer Einsatz	177
32.3	Nebenwirkungen	177
33	Oxytozin	178
33.1	Biologische Grundlagen	178
33.2	Veterinärmedizinischer Einsatz	178
33.3	Nebenwirkungen	178

Anhang

34	Literaturverzeichnis	180
35	Sachverzeichnis	181

Teil I Basiswissen und Untersuchungsgang

1	Praktische Aspekte der Anatomie und Physiologie der Geschlechtsorgane	2
2	Hormonelle Regulation der Sexualfunktionen	8
3	Sexualzyklus	13
4	Geschlechtsentwicklung und deren Störungen	21
5	Pubertät, Geschlechtsreife, Zuchtreife	24
6	Gravidität	27
7	Geburt	29
8	Wurfgröße	31
9	Der gynäkologische Untersuchungsgang	32
10	Trächtigkeitsuntersuchung	59
11	Der geburtshilfliche Untersuchungsgang	62
12	Dokumentation und Besitzeraufklärung	72

1 Praktische Aspekte der Anatomie und Physiologie der Geschlechtsorgane

1.1

Äußere Geschlechtsorgane

1.1.1 Rima vulvae

Die Ausprägung der Rima vulvae unterliegt zyklusabhängigen Veränderungen, die diagnostische Bedeutung haben. Östrogene verursachen eine **Vergrößerung der Labien** durch Ödematisierung (► **Abb. 1.1**), die daher als klinisches Symptom für Östrogenkonzentrationen über dem Basalwert herangezogen werden kann. Die Rima vulvae wird von einer Dorsalfalte bedeckt, unter der sich bei starker Ausprägung, insbesondere bei Hunden mit faltiger Haut, häufig eine **Vulvadermatitis** entwickelt (► **Abb. 1.2**). Nach Kastration bilden sich bei einigen Hündinnen die Labien zurück (► **Abb. 1.3**),

► **Abb. 1.1** Rima vulvae einer Hündin im Anöstrus (a) und im Proöstrus (b). Die Labien sind unter dem Einfluss steigender Östrogenkonzentrationen deutlich vergrößert.

► **Abb. 1.2** Chronische Vulvadermatitis bei einer Hündin mit deutlich ausgeprägter Dorsalfalte (a). Das Ausmaß der Veränderungen zeigt sich erst nach Rasur und Straffung der Dorsalfalte (b). In den Vertiefungen lateral der Rima vulvae sammelt sich Harn und führt zu einem stetigen Entzündungsreiz. Therapie: chirurgische Straffung der Dorsalfalte.

► **Abb. 1.3** Vulvahypoplasie bei einer Hündin nach juveniler Kastration. Die Vulva ist kaum sichtbar. Diese Veränderung prädisponiert zu chronisch entzündlichen Veränderungen.

die äußere behaarte Haut dreht sich nach innen, sodass die Haare zu einer chronischen Reizung der Vestibularschleimhaut führen. Dies kann Ursache von rezidivierenden Vestibulovaginitiden sein.

Praxisrelevante

Veränderungen an der Vulva

- **Vulvaödematisierung:** im Zusammenhang mit erhöhten Östrogenwerten (Proöstrus ▶ S. 15/Östrus ▶ S. 16, östrogensynthesisierenden Ovarialzysten ▶ S. 148 und Ovarialtumoren ▶ S. 150, Läufigkeit nach unvollständiger Kastration ▶ S. 163)
- **Vulvahypoplasie:** Unterentwicklung der Vulva bei juveniler Kastration, teilweise auch als angeborene Störung
- **Vulvaatrophie:** Rückentwicklung der Vulva nach Kastration (▶ S. 157)
- **Vulvadermatitis:** insbesondere bei ausgeprägter Dorsalfalte und Harninkontinenz
- **Vulvatumoren:** neben primären Vulvaneoplasien treten im perivulvären Bereich gehäuft Mastzelltumoren auf

1.1.2 Klitoris

Beim Spreizen der Rima vulvae wird die **Klitorisfalte** sichtbar, in der die Klitoris liegt (▶ Abb. 1.4). Bei stark ausgeprägter Klitorisfalte besteht beim Schieben eines Spekulum die Gefahr von Verletzungen. Die Klitoris stellt ein hormonsensitives Organ dar,

▶ **Abb. 1.4** Klitorisfalte bei einer Hündin. Die Rima vulvae ist gespreizt. Der Pfeil weist auf die Klitorisfalte. Im Rahmen der Vaginoskopie und der Tupferprobenentnahme aus dem Genitale ist darauf zu achten, die Klitorisfalte nicht zu verletzen.

▶ **Abb. 1.5** Deutliche Clitorishypertrophie bei einer Jung-hündin, deren Mutter während der Trächtigkeit das Gestagen Altrenogest verabreicht wurde. Aufgrund der Gefahr mechanischer Irritationen sollte eine operative Entfernung der Klitoris erfolgen.

das durch Stimulation mit Androgenen, Glukokortikoiden und Gestagenen (▶ S. 171) eine **Hypertrophie** entwickelt. Häufig bleibt die Vergrößerung auch nach Entzug des auslösenden Stimulus erhalten, sodass im Einzelfall eine operative Entfernung erfolgen muss (▶ Abb. 1.5). Eine Clitorishypertrophie kann zudem bei Intersexualität und bei chronischer mechanischer Reizung beobachtet werden.

* Ursachen

Klitorishypertrophie

- angeboren
 - Intersexualität (▶ S. 21)
 - Gabe von Androgenen während der Trächtigkeit (▶ S. 22)
 - Gabe von Gestagenen während der Trächtigkeit (▶ S. 171)
- erworben
 - Gabe von Androgenen (▶ S. 81)
 - Gabe von Glukokortikoiden (▶ S. 81)
 - Hyperadrenokortizismus (▶ S. 82)
 - mechanische Reizung durch Belecken

Im Einzelfall kann sich ein Klitoris Knochen (Os clitoridis) ausbilden.

1.1.3 Gesäuge

Das Gesäuge besteht in der Regel aus 5 Mammaplexen auf jeder Körperseite (4–6), die sich links und rechts der Medianen leicht versetzt anordnen, was die Erreichbarkeit beim Säugen für die Welpen erleichtert. Jeder Mammaplex besteht

aus mehreren Drüsenkomplexen, die mit einem eigenen Ausführungsgang an der Zitze münden.

Die Blut- und Lymphgefäßversorgung hat für die potenzielle Metastasierung von Mammatumoren Bedeutung. Dabei sind arterioarterielle und venovenöse Anastomosen stark ausgeprägt (► Abb. 1.6).

! Bei Operationen an der Mamma ist auf eine Ligatur der Arteria epigastrica caudalis superficialis, die durch den Leistenkanal die Abdominalhöhle verlässt, zu achten. Verletzungen dieses Gefäßes führen zu massiven Blutungen. Wird es versehentlich durchschnitten, kann es sich in die Bauchhöhle zurückziehen. Zur Blutstillung ist in diesen Fällen eine Laparotomie notwendig.

Die Lymphdrainage erfolgt hauptsächlich durch 2 Lymphozentren. Das Lymphocentrum inguinale superficiale (1–2 Knoten) befindet sich unterhalb des Mammagewebes des kaudalsten Gesäugekomplexes etwa 2–4 cm vor dem knöchernen Beckenboden. Es ist bei mittelgroßen Hunden in der Regel auch im unveränderten Zustand dorsal des inguinalen Mammakomplexes palpatorisch zu erfassen. Seine Lymphknoten sammeln die Lymphe aus den kaudalen 3 Mammakomplexen.

Das Lymphocentrum axillare besteht aus einem tastbaren Lymphknoten, der sich bei

► **Abb. 1.6** Gesäuge einer Hündin. Typisch sind 5 Zitzen auf jeder Körperseite, die zu jeweils einem Mammakomplex gehören, wobei der kranialste Komplex häufig am geringsten ausgebildet ist (unten im Bild), 4 Mammakomplexe kommen ebenfalls vor (oben). Die Lymphdrainage erfolgt in erster Linie über das Lymphocentrum inguinale superficiale (linkes Oval) und über das Lymphocentrum axillare (rechtes Oval).

vorgeführter Vordergliedmaße im Bereich des 1. Interkostalraums bis zur 2. Rippe auf Höhe des Schultergelenks befindet, und aus einem kleineren Lymphknoten, der nur bei etwa 25% der Hunde nachgewiesen werden kann. Er liegt beim stehenden Hund senkrecht oberhalb des Ellenbogenhöckers und ist, falls vorhanden, in der Regel palpierbar. Das Lymphocentrum axillare fasst vornehmlich die Lymphe der kranialen 3 Komplexe zusammen.

! Beim Vorliegen von Mammatumoren können sich zusätzliche Wege des lymphatischen Abflusses des befallenen Komplexes herausbilden, die keinem Schema folgen.

Erkrankungen des Gesäuges

- Tumoren (► S. 136)
- Mastitis (► S. 136)
- Milchstau (► S. 137)
- Scheingravidität (► S. 138)

1.2

Innere Geschlechtsorgane

1.2.1 Vestibulum und Vagina

Das Vestibulum ist bei der Hündin relativ lang (► Abb. 1.7, Abb. 1.8). Der kraniodorsale Verlauf muss bei der vaginalen Untersuchung beachtet werden. Der Übergang zwischen Vestibulum und Vagina ist durch die äußere Mündung der Harnröhre gekennzeichnet und findet sich kranial des Arcus ischiadicus. Da sich Vestibulum und Vagina embryologisch aus 2 unterschiedlichen Strukturen entwickeln, die miteinander verschmelzen, besteht bei vielen Hündinnen im Bereich des vestibulovaginalen Übergangs eine natürliche Engstelle (**Cingulum**). Das Cingulum erweitert sich normalerweise während der Läufigkeit und in der Geburt. In Einzelfällen stellt es bei vaginaler Untersuchung, Bedeckung und Geburt ein Hindernis dar, das erweitert werden muss. **Entwicklungsstörungen** im Bereich des Vestibulovaginalkanals können zur Störung der Bedeckung oder der Austreibungsphase in der Geburt führen. Der Vaginalkanal erstreckt sich bis in den Bereich der letzten Lendenwirbel und endet kranial blind. Der Rüde ist ein Scheidenbesamer. Das Ejakulat wird in der Vagina abgesetzt.

► **Abb. 1.7** Topografie der kaudalen Geschlechtsorgane bei der Hündin. Als tierartige Besonderheit ist der lange Vestibulovaginalkanal zu beachten, der von der Vulva nach kranial steil ansteigt (Pfeil: Übergang von Vagina zu Zervix) (nach Baumgartner W. Klinische Propädeutik der Haus- und Heimtiere. 7. Aufl. Stuttgart: Parey; 2009).

Praxisrelevante Erkrankungen der Vagina und des Vestibulums

- Vaginitis:
 - juvenile Vaginitis (► S. 107)
 - adulte Vaginitis (► S. 107)
- Vestibulitis (► S. 107)
- Engstellen: Septen, Strikturen, Stenosen (► S. 89)
- Tumoren (► S. 142)
- Vaginalprolaps (► S. 142)

! Die Länge des Vaginalkanals wird häufig unterschätzt, was zur Folge hat, dass zu kurze Spekula gewählt werden, um die gesamte Vagina und den vaginalen Anteil der Zervix zu beurteilen.

Das makroskopische Aussehen und der histologische Aufbau der Vaginalschleimhaut unterliegen zyklusabhängigen Veränderungen. Mit steigender Östrogenkonzentration im Proöstrus kommt es zu vermehrten Zellteilungen der Vaginalepithelzellen. Aus dem 3- bis 4-schichtigen Epithel entwickelt sich ein Zellverband mit über 20 Zellschichten. Bei fallenden Östrogenwerten flacht das

► **Abb. 1.8** Der Übergang von Vagina zur Zervix befindet sich auf Höhe der letzten Lendenwirbel (Pfeil). Diese anatomischen Verhältnisse sind bei der Wahl der Vaginoskopklänge zu beachten.

Vaginalepithel wieder ab (► **Abb. 1.9**). Mit dieser Entwicklung gehen Veränderungen der Zellmorphologie und der färberischen Eigenschaften des Zytoplasmas einher, die im Rahmen der exfoliativen Vaginalzytologie (► S. 36) Bedeutung haben.

Vestibulum und Vagina sind regelmäßig bakteriell besiedelt, wobei die Keimdichte und die Anzahl der Bakterienspezies von kaudal nach kranial abnimmt (► S. 53). Die Quantität der Keimflora unterliegt zyklusabhängigen Veränderungen, wobei unter Östrogeneinfluss eine Zunahme zu beobachten ist. Neben aeroben Bakterien kommen regelmäßig anaerobe Keime vor.

Aufgrund des spezifischen Scheidenmilieus der Hündin spielen Pilzinfektionen der Vagina keine Rolle. Da die Hündin einen alkalischen vaginalen pH-Wert besitzt, sind die humane und canine Vaginalflora unterschiedlich.

► **Abb. 1.9** Das Vaginalepithel unterliegt östrogenabhängigen Veränderungen. Mit steigenden Östrogenkonzentrationen nimmt die Anzahl der Zellschichten zu. Fällt die Östrogenkonzentration, nimmt die Epitheldicke wieder ab.