

Manfred Wolfersdorf, Michael Schüler

Depression im Alter

Diagnostik, Therapie, Angehörigenarbeit
und Fürsorge

Kohlhammer

Wichtiger Hinweis:

Die Verfasser haben größte Mühe darauf verwandt, dass die Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen dem jeweiligen Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entsprechen.

Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, übernimmt der Verlag für derartige Angaben keine Gewähr.

Jeder Anwender ist daher dringend aufgefordert, alle Angaben auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Verantwortung des Benutzers.

Manfred Wolfersdorf, Michael Schüler

Depressionen im Alter

Diagnostik, Therapie, Angehörigenarbeit,
Fürsorge, Gerontopsychiatrische
Depressionsstationen

Unter Mitarbeit von
Angela LePair, Wolfgang Bär,
Christian Mauerer, Hella Schulte-Wefers
und Stefan Dipper

Verlag W. Kohlhammer

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.

1. Auflage 2005

Alle Rechte vorbehalten

© 2004 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart

Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher

Gesamtherstellung:

W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. Stuttgart

Printed in Germany

ISBN 3-17-018316-8

E-Book-Formate:

pdf: ISBN 978-3-17-026598-1

Inhalt

Autorenverzeichnis	VII
1 Einleitung – Alter und psychische Erkrankung	1
2 Gedanken zum Altern – Was bedeutet „höheres Alter“?	8
3 Depressionen im Alter	11
3.1 Zur Epidemiologie depressiver Störungen im Alter	11
3.2 Das klinische Bild depressiver Syndrome im Alter	17
3.2.1 Depressive Episode	17
3.2.2 Psychopathologische Akzentuierung der Depression im höheren Lebensalter ..	18
3.2.3 Diagnostik der Depression im höheren Lebensalter.....	26
3.2.4 Formen depressiver Syndrome im Alter	29
3.3 Psychodynamische Überlegungen zur Depression im Alter.....	35
3.4 Kulturelle und psychosoziale Aspekte der Depression im Alter.....	42
4 Differentialdiagnose bei Depressionen im Alter	50
4.1 Niedergeschlagenheit, Trauer, Depression im Alter	52
4.2 Schlafstörungen im Alter	58
4.3 Depression und Demenz	65
4.4 Komorbidität bei depressiven Erkrankungen im Alter	75
4.5 Testpsychologische Aspekte der Diagnostik.....	81
5 Verlaufsaspekte bei Depressionen im Alter.....	85
6 Psychotherapie mit alten depressiven Menschen.....	90
6.1 Definition und theoretische Vorbemerkungen.....	90
6.2 Psychotherapie im Alter	93
6.3 Die therapeutischen Verfahren und die Behandlung von depressiven älteren Menschen.....	98
6.4 Therapeutischer Prozess und wichtige Themen im Gespräch mit depressiven älteren Menschen	103
6.5 Probleme in der Psychotherapie mit alten depressiven Menschen.....	106
6.6 Falldarstellungen	107
6.7 Kompetenzen und Ressourcen im Alter	109
6.8 Humor in der Psychotherapie	114

Inhalt

7	Psychopharmakotherapie und andere somatische Behandlungsmöglichkeiten bei Depressionen im Alter	126
7.1	Allgemeine Vorbemerkungen	126
7.2	Psychopharmakotherapie der Depression im höheren Lebensalter	128
7.3	Andere somatische Behandlungsmöglichkeiten	133
8	Sozialpädagogisch-psychoedukative und andere Maßnahmen	135
9	Ambulante, tagesklinische oder vollstationäre Behandlung – Entscheidungshilfen	137
9.1	Ambulante Behandlung/ambulantes Setting	137
9.2	Stationäres Setting	139
9.2.1	Vollstationäre Behandlung	139
9.2.2	Teilstationäre (tagesklinische) Behandlung	141
10	Exkurs: Der ältere depressive Patient beim Hausarzt	143
10.1	Zwei Patientenschilderungen aus der „Hausarztpraxis“	144
10.2	Welches Handwerkszeug eignet sich zur Diagnose einer Depression in der Hausarztpraxis?	146
10.3	Anmerkungen zur Therapie	147
11	Gerontopsychiatrische Depressionsstation: Das stationäre Diagnostik- und Therapieangebot der Station G3 am Bezirkskrankenhaus Bayreuth	149
11.1	Stationsbeschreibung	149
11.2	Therapeutische Angebote im Überblick	153
11.3	Nachsorge	168
12	Gedanken zur Prävention depressiver Störungen im Alter	170
13	Suizidalität im höheren Lebensalter	174
13.1	Begriffsbestimmung	175
13.2	Entwicklungsmodelle von Suizidalität	176
13.3	Suizidalität bei alten Menschen	182
13.4	Grundzüge der Suizidprävention im höheren Lebensalter	184
14	Altern und Sterben	188
15	Abschlussbemerkungen	190
	Literatur	192
	Sachverzeichnis	204

Autorenverzeichnis

Professor Dr. med. **Manfred Wolfersdorf**, Arzt für Psychiatrie – Psychotherapie –, Arzt für Psychosomatische Medizin; Leiter der Abteilung Depressionszentrum/Psychotherapie und Psychotherapeutische Medizin; Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth

Dr. med. **Michael Schüler**, Arzt für Psychiatrie und Neurologie – Psychotherapie –; Leitender Arzt der Abteilung Gerontopsychiatrie und -psychotherapie der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Bezirkskrankenhauses Bayreuth, Stellvertretender Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Bezirkskrankenhauses Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth

Frau Dipl.-Psych. **Angela LePair**, Diplom-Psychogerontologin, Psychologische Psychotherapeutin; Psychologische Leiterin der Gerontopsychiatrischen Depressionsstation der Abteilung Gerontopsychiatrie und -psychotherapie, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Bezirkskrankenhauses Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth

Dr. med. **Christian Maurer**, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie; Leiter des Demenzzentrums mit Gedächtnisambulanz der Abteilung Gerontopsychiatrie und -psychotherapie, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Bezirkskrankenhauses Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth

Wolfgang Bär, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie; Oberarzt der Abteilung Gerontopsychiatrie und -psychotherapie, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Bezirkskrankenhauses Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth

Frau **Hella Schulte-Wefers**, (ehemals) Stationsärztin der Gerontopsychiatrischen Depressionsstation, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Bezirkskrankenhauses Bayreuth, Nordring 2, 95445 Bayreuth

Dr. med. **Stefan Dipper**, niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin – Psychotherapie – in eigener Praxis, Lohbauerstraße 6, 70597 Stuttgart

1 Einleitung – Alter und psychische Erkrankung

„For the first time in history most people in societies such as our own can plan on growing old ... Even those who are currently „old“ can expect to live for many years ...“: Eine fast enthusiastische Einleitung des amerikanischen Lehrbuches „Geriatric Psychiatry“ (2. Auflage) von Spar und La Rue (1997). Hintergrund dieser Anmerkung ist der drastische Wandel in der Altersstruktur, dem die Weltbevölkerung in einem bisher nicht gekannten Ausmaße unterliegt. So erwartet das Statistische Bundesamt (1998) in seinem Gesundheitsbericht für Deutschland eine mehr als 10 %ige Steigerung des Anteils der über 60-jährigen Menschen im Jahre 2010 auf 24,9 %. Damit erhält der Altersaufbau der Bevölkerung ein deutlich verändertes Gesicht und es entwickelt sich aus einer „Alterspyramide“ ein eher „pilzförmiges“ Verteilungsgebilde mit einem hohen Anteil älterer und alter Menschen. Nicht nur aus allgemeiner gesundheitspolitischer Sicht, sondern auch aus psychiatrisch-psychotherapeutischer kommt den höheren Altersgruppen damit steigende Bedeutung zu. Soweit heute vom höheren Lebensalter die Rede ist, wird weitgehend von den über 65-Jährigen ausgegangen (Häfner 1991), obwohl diese Altersgrenze einigermaßen willkürlich gewählt ist und ihre Begründung darin findet, dass mit Ende des 65. Lebensjahres meist das Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben vorgegeben ist, damit soziologisch die Altersphase des menschlichen Lebenszyklus eingeleitet wird. Dabei wird zunehmend deutlich, dass auch dieser Lebensabschnitt sich in unter-

schiedliche Phasen teilen lässt, denkt man z. B. an die über 80-Jährigen als sog. Hochbetagte. Das biologische Altern und auch das psychologische Altern befinden sich bei vielen Menschen zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr dagegen in einem kontinuierlichen Prozess, woraus sich die Unschärfe der Zugehörigkeit mancher Erkrankungen zum mittleren und höheren Lebensalter ergibt. Weiterhin ist zu bedenken, dass alle Aussagen nur für die gegenwärtige Altersbevölkerung, nicht für die Vergangenheit oder die Zukunft gelten können, zumal die Zusammensetzung in den letzten 50 Jahren in den Industrienationen relativ und auch hinsichtlich der absoluten Zahlen steil zugenommen hat (Tabelle 1 und 2).

Diesen altersdemographischen Veränderungen stehen strukturelle gegenüber, die hier nur punktuell angeführt werden können, so die niedrigen Geburtenziffern, die in jüngeren Generationen veränderten Familienstrukturen, die Zunahme nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften, von Single-Haushalten und die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen. Dies würde sich z. B. auf die Forderung von häuslicher Pflege auswirken, die dann nur noch schwer erfüllbar wird und die Verfügbarkeit privater und eine verstärkte Notwendigkeit professioneller Hilfen bedingen würde. So fehlen wahrscheinlich auf längere Sicht Personen, die eine immer größer werdende Anzahl unterstützungs-, hilfs- und pflegebedürftiger älterer Menschen versorgen können. Nach Angaben der „Gesundheitsberichterstattung des Bundes“ (Kruse et al. 2002) sind derzeit 2,4 % von rund 82 Millionen

Tabelle 1: Altersstrukturelle Verschiebungen in der Bevölkerungsentwicklung Deutschlands

	1950	1995	2010
Bevölkerung insgesamt in Tausend	69346	81817	83433
Alter in Jahren			in %
< 1	1,5	0,9	0,8
1–4	5,3	4,0	3,2
5–14	16,4	11,2	9,1
15–19	7,3	5,4	5,4
20–39	26,4	30,7	24,6
40–59	28,6	26,7	31,9
60–79	13,6	17,0	20,4
80–89	1,0	3,6	4,0
> 90	0,0	0,5	0,5

Quelle: StBA, Bevölkerungsstatistik, 8. koordinierte Vorausberechnung. Aus: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Gesundheitsbericht für Deutschland. Metzler-Poschel, Stuttgart 1998, S. 18, mod.

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland

• Bevölkerung 2001 (in 1000) (Stand 30.09.2001)		m	40 255					
		w	42 148					
		gesamt	82 403					
• nach Altersgruppen								
Alter von ... bis unter ... Jahren		(Angaben in %)						
Jahr		unter 6	6– 15	15– 18	18– 21	21– 45	45– 65	65 u. älter
1991	m	7,1	10,1	3,2	4,1	38,9	26,2	10,4
	w	6,3	9,0	2,8	3,6	34,4	24,7	19,1
	ges	6,7	9,5	3,0	3,8	36,6	25,4	14,9
1995	m	6,4	10,6	3,4	3,3	38,9	25,8	11,5
	w	5,8	9,6	3,1	3,0	34,7	24,4	19,4
	ges	6,1	10,1	3,3	3,1	36,7	25,1	15,6
2000	m	6,0	10,3	3,5	3,6	37,0	26,4	13,2
	w	5,5	9,3	3,1	3,3	33,5	25,3	20,0
	ges	5,7	9,8	3,3	3,5	35,2	25,9	16,6

nach BMG Statistisches Taschenbuch „Gesundheit 2002“ (Tabelle 1.1 – 1.3), Quelle StBA

Einwohnern in Deutschland, d. h. 18,4 Millionen Menschen, 60 Jahre und älter. Die mittlere Lebenserwartung der Frauen betrug im Jahre 1900 rund 48 Jahre, die der Männer rund 45 Jahre und stieg im Laufe des Jahrhunderts bis 1998 auf 80 Jahre für Frauen und 74 Jahre für Männer. Verantwortlich hierfür ist u. a. auch das Sinken der Sterblichkeit in den höheren Altersgruppen. Dabei nahm die Zahl der Hochaltrigen, d. h. der 80 Jahre und älteren Menschen, kontinuierlich zu und wird sich für das Jahr 2010 auf rund 4 Millionen und für das Jahr 2020 auf ca. 5,3 Millionen und damit von 3,5 % derzeit auf 6,6 % erhöhen. Die Altersstrukturverschiebung der Bevölkerung in Deutschland wird sich voraussichtlich auch in Zukunft weiter fortsetzen und dazu führen, dass der Bevölkerungsanteil junger Menschen in absehbarer Zukunft kleiner sein wird als jener der alten Menschen (Kruse et al. 2002).

Tabelle 3: Aspekte eines erweiterten Verständnisses von Gesundheit

Körperliche und seelische Erkrankungen
Körperliches und seelisches Wohlbefinden
Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
Erhaltene Aktivität im Sinne der Ausübung persönlich bedeutsamer Aufgaben
Selbstständigkeit im Alltag
Selbstverantwortung in der Alltagsgestaltung und Lebensplanung
Offenheit für neue Erfahrungen und Anregungen
Fähigkeit zur Aufrechterhaltung und Gründung tragfähiger sozialer Beziehungen
Fähigkeit zum reflektierten Umgang mit Belastungen und Konflikten
Fähigkeit zur psychischen Verarbeitung bleibender Einschränkungen und Verluste
Fähigkeit zur Kompensation bleibender Einschränkungen und Verluste

Quelle: Kruse 1999

Dabei gilt eine selbstständige, selbstverantwortliche und persönlich sinnerfüllte Lebensgestaltung als ein wesentliches Merkmal (Tabelle 3) der Gesundheit im Alter (zitiert nach Kruse et al. 2002). Wenn auch prozentual der Anteil psychisch kranker Menschen mit dem Alter steigt – 22 % der 65-Jährigen und der älteren Menschen gelten als krank (Tabelle 4) –, so ist doch festzuhalten, dass der Großteil, nämlich 77 %, der über 65-Jährigen als nicht krank oder unfallverletzt gilt. Auffällig ist dabei (Tabelle 5), dass der Anteil psychischer Erkrankungen zwar bei Männern und Frauen von 65–74 auf 75 und mehr Jahre jeweils um 60 bis 70 % ansteigt, psychische Krankheiten und die vollstationären Krankenhausbehandlungsfälle nach Häufigkeit eher im unteren Drittel rangieren. Nach Kruse et al. (2002) spricht dies einerseits für eine hohe psychische Widerstandsfähigkeit alter Menschen. Allerdings, so die Autoren, geht diese bei einer Kumulation von Beeinträchtigungen und bei einer gleichzeitigen Abnahme der physischen, kognitiven, sozialen und materiellen Ressourcen zurück, und es nimmt dann in Situationen deutlich verringerter körperlicher Widerstandsfähigkeit auch die Gefahr psychischer Störungen zu.

Geht man mit Dilling und Weyer (1984) sowie Fichter (1990) für einen ländlichen Raum von 23,1 % bzw. 19,7 % bei den 65–74-Jährigen und 28,1 % bei den über 75-Jährigen und für den städtischen Raum am Beispiel Mannheim (Cooper und Sosna 1983) von 24,4 % psychische Störungen in der 65 und mehr Jahre alten Bevölkerung aus, dann ist es naheliegend, dass sich aus dem Gesamtgebiet der Psychiatrie und Psychotherapie das Teilgebiet ausschälte, das sich als „Gerontopsychiatrie und -psychotherapie“ für die psychischen Störungen bei älteren Menschen zuständig fühlt. Unter der Vorstellung, dass ein psychisch kranker alter Mensch zwar ein Erwachsener ist, für den psychische Konflikte, Trieb-

Tabelle 4: Gesundheitszustand der Bevölkerung in Deutschland

Alter in Jahren m/w gesamt		Bevölkerung mit Angaben über die Gesundheit	Kranke	Unfallver- letzte	nicht krank/ unfallver- letzt	keine Angaben
Anzahl in 1000			%	%	%	%
15 J	unter m	5 568	4,5	0,4	95,1	13,4
	w	5 268	4,3	0,4	95,3	13,3
	ges	10 836	4,4	0,4	95,2	13,4
40 J	15 – m	12 192	5,4	1,1	93,5	14,1
	w	11 626	5,8	0,5	93,7	13,9
	ges	23 818	5,6	0,8	93,8	14,0
65 J	40 – m	12 292	10,8	0,8	88,3	12,4
	w	12 217	10,5	0,6	88,0	12,3
	ges	24 509	10,7	0,7	88,6	12,3
65 u. älter	m	4 778	21,4	0,5	78,1	10,8
	w	7 414	22,4	1,0	76,7	12,9
	ges	12 193	22,0	0,8	77,2	12,1
insge- samt	m	34 830	9,4	0,8	89,8	12,9
	w	36 525	10,5	0,6	88,9	13,1
	ges	71 355	10,0	0,7	89,3	13,0

Mikrozensus April 1999; nach BMG Statistisches Taschenbuch „Gesundheit 2002“ (Tabelle 3.1);
Quelle StBA

bedürfnisse und psychodynamische Gesetzmäßigkeiten genauso gelten wie für einen Jüngeren, gleichzeitig aber die psychosozialen und biographischen Prägungen andere sind, der alte Mensch deutlich mehr mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert ist und er in dieser letzten Lebensphase einerseits Fertigkeiten und neue Formen des Erlebens und Handelns erwerben kann, andererseits aber auch neuen Belastungen und Krisen ausgesetzt ist, die er bewältigen muss, dann folgen daraus mehr oder minder spezifische und altersbezogene diagnostische, therapeutisch-rehabilitative und pflegerische Notwendigkeiten, die in einer zunehmenden Differenzierung von Gerontopsychiatrie und -psychotherapie

im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich deutlich werden.

In der Praxis war die „Psychiatrie des höheren Lebensalters, die Gerontopsychiatrie“ lange Zeit eine Psychiatrie der dementiellen Erkrankungen und ein Ort für vielfältig hilfs- und pflegebedürftige Menschen, auch unter dem Einfluss eines vorherrschenden Defizitmodells des Alters, in welchem überwiegend Verlust und Abbau gesehen wurden und der Mensch der nachlassenden Funktionsfähigkeit schicksalhaft ausgeliefert betrachtet wurde. Auch das „Disuse“-Modell, wonach Funktionen zwar nicht altersbedingt abgebaut, sondern durch mangelnden Gebrauch nicht mehr nutzbar werden, war nicht befriedigend.

Tabelle 5: Anzahl vollstationärer Krankenhausbehandlungsfälle 1998, pro 100 000 der Bevölkerung nach Krankheitsklassen, Altersgruppen und Geschlecht

ICD9		65–74 Männer	75+ Männer	65–74 Frauen	75+ Frauen
001–139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	380	640	340	616
140–239	Neubildung	7 714	7 986	5 174	4 573
240–279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunsystem	971	1 296	1 427	1 932
280–289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	245	645	240	634
290–319	Psychische Krankheiten	699	1 218	844	1 413
320–389	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	2 316	4 214	2 487	4 487
390–459	Krankheiten des Kreislaufsystems	13 117	18 320	7 885	14 245
460–519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 276	4 515	1 116	2 341
520–579	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 769	5 198	2 716	4 117
580–629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	2 452	3 560	1 832	1 809
680–709	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	376	534	317	532
710–739	Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	2 304	2 110	3 280	2 818
780–799	Symptome und schlecht bezeichnete Zustände	1 443	2 361	997	2 067
800–999	Verletzungen und Vergiftungen	1 876	3 467	2 541	6 143

Quelle: Stat. Bundesamt, Krankenhausdiagnosestatistik

Erst das z. B. von Kruse (1989) formulierte „Kompetenzmodell“ richtete den Blick auf das, was ein alter Mensch kann und nicht wie früher auf Art und Anzahl seiner Defizite. „Dieses Kompetenzmodell ist weit mehr als der Vergleich zwischen halb vollem oder halb leerem Glas“, so Schüler (1998): Es ist eine ressourcenorientierte Denkweise.

Beim alten Menschen sind die Übergänge zwischen gesund und krank häufig fließend, leichte psychische Auffälligkeiten

wie Vergesslichkeiten in Einzelbereichen sind nicht immer gleich krankhaft. Soll z. B. das Ausmaß von Hirnleistungsstörungen eines alten Menschen festgestellt werden, so muss zu deren Beurteilung der frühere Intelligenzstand, die berufliche Einbettung und Herkunft, die aktuelle Lebenssituation einfließen, um nicht ein falsches Bild von den aktuellen kognitiven Fähigkeiten zu erhalten. Dies kann von erheblicher Bedeutung hinsichtlich der Entscheidung werden, welche Unterstützung, Behandlung

oder Pflege einem kranken alten Menschen angeboten wird, nämlich ressourcenorientiert und nicht defizitorientiert. Die Beschäftigung der Psychiatrie mit den Erkrankungen des höheren Lebensalters reicht nach Häfner (1991) bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts zurück; so seien damals die senile Demenz von Esquirol oder die Depression im höheren Lebensalter von Griesinger bereits beschrieben worden. Heute hat sich die Gerontopsychiatrie von einer Psychiatrie der Demenzen und der Pflegebedürftigkeit entwickelt hin zu einer „Psychiatrie und Psychotherapie des höheren Lebensalters“, wobei naturgemäß die Diagnostik und Behandlung dementieller Erkrankungen als einer dem ausgehenden mittleren und dem höheren Lebensalter zugewiesenen Erkrankung einen breiteren Raum einnimmt als beispielsweise die Behandlung schizophrener oder süchtiger Störungen, deren Ersterkrankungsalter überwiegend im frühen Erwachsenenalter anzusiedeln ist.

Gegenstand der Psychiatrie und Psychotherapie des höheren Lebensalters sind also **psychische Erkrankungen** – deren Erscheinungsbild, Verlauf, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie Ausgang -, die in dieser Lebensphase verstärkt auftreten. Die Forschung sucht dabei nach den Ursachen dieser psychischen Erkrankungen im höheren Lebensalter, nach den auslösenden Faktoren im biologischen, sozialen, lebensgeschichtlich-biographischen Bereich, nach Möglichkeiten der Therapie, der primären Prävention sowie der sekundär- und tertiärpräventiven Erkrankungs- und Wiedererkrankungsverhütung.

Schwerpunkt aller präventiven sowie therapeutisch-pflegerischen und -rehabilitativen Bemühungen müssen dabei die **Gemeindenähe** und der **möglichst lange Erhalt der häuslichen Umgebung**, ein **weitgehend selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung** und die gegebenenfalls in der eigenen Familie gesicherte **Lebensqualität**

des alten Menschen sein. Hierzu bedarf es der engen Zusammenarbeit aller Beteiligten wie Hausarzt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie/Nervenarzt, Sozialstation sowie Gemeindeschwester, ambulanter psychiatrischer bzw. gerontopsychiatrischer Pflege, des Sozialpsychiatrischen Dienstes, der Gerontopsychiatrischen Institutsambulanzen der Fachkrankenhäuser und Abteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie, der Gesundheitsämter, sowie teilstationärer und stationärer Angebote in Form gerontopsychiatrisch-psychotherapeutischer Tagesstätten, Tageskliniken, Abteilungen und Stationen in Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Auch in der Gerontopsychiatrie und -psychotherapie gelten die Grundprinzipien der Psychiatrie-Enquete sowie der Psychiatrie-Landespläne „ambulant vor stationär“ sowie „Gemeindenähe“.

Innerhalb des vollstationären gerontopsychiatrischen und -psychotherapeutischen Feldes zeichnet sich heute eine **Tendenz zu differenzierten Behandlungsangeboten** ab, die störungsspezifisch ausgerichtet sind. So weisen größere Abteilungen für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie zunehmend Diagnostik- und Behandlungsschwerpunkte, auch als stationäre Struktur angelegt, z. B. im Bereich der depressiven Erkrankungen des höheren Lebensalters (s. später Darstellung eines stationären Behandlungskonzeptes für alte depressiv kranke Menschen) mit ihrer spezifischen Problemstellung auf. Sodann entstehen (bzw. sind entstanden) beschützende Stationen für die Diagnostik und Differentialdiagnostik und vor allem für die Behandlung von Menschen mit mittelgradigen und schweren dementiellen Störungen, wobei hier z. B. eine entsprechende Gerontopsychiatrische Ambulanz (Gedächtnisambulanz, sog. Memory-Clinic) oder auch tagesklinische Angebote vorgestellt werden. Weitere neuere Entwicklungen in der klinischen Gerontopsychiatrie und -psychotherapie sind suchtspezifische Ansätze für alte